

# Simecol Forte 240 x30 kapsułek

Cena: 18,48 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	30 kapsułek
Podmiot odpowiedzialny	Noris
Postać	kapsułki
Substancja czynna	symetikon
Typ produktu	wyrób medyczny leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

## Opis produktu

### WSKAZANIA

SIMECOL Forte 240 to wyrób medyczny zalecany w przypadku wzdęć, uczucia pełności, nadmiernego gromadzenia się gazów i odbijania, a także dla pacjentów przed wykonaniem badań diagnostycznych jamy brzusznej.

### DZIAŁANIE

SIMECOL Forte 240 jest przeznaczony do stosowania w celu łagodzenia uczucia pełności, uczucia wzdęcia, odbijania, dolegliwości związanych z nadmiernym gromadzeniem się gazów oraz powietrza w przewodzie pokarmowym, które powodują napięcie i ucisk w jelitach.

### SKŁAD

1 kapsułka zawiera:

- Symetikon - 240 mg

### DAWKOWANIE

SIMECOL Forte 240 stosuje się doustnie, przed lub po posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 1 szklanka wody). W trakcie stosowania preparatu nie zaleca się picia napojów gazowanych.

Objawy związane z napięciem i uciskiem w jelitach:

- Dorośli: doraźnie, 1 kapsułka, 2–4 razy dziennie; maksymalnie 4 kapsułki dziennie (960 mg symetykonu).
- Kobiety w ciąży: dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U osób chorych na cukrzycę nie jest wymagana zmiana dawkowania.
- Dzieci od 12. do 18. roku życia: doraźnie, 1 kapsułka dziennie.

Przygotowanie do badań diagnostycznych:

- Dorośli: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.
- Kobiety w ciąży: dawkowanie i sposób użycia według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- U osób chorych na cukrzycę nie jest wymagana zmiana dawkowania.
- Dzieci od 12. do 18. roku życia: 1 kapsułka wieczorem w dniu poprzedzającym badanie diagnostyczne i 1 kapsułka rano, na czczo, w dniu badania diagnostycznego.

Wyrób może być stosowany u osób chorych na cukrzycę oraz u osób z zaburzeniami trawienia cukrów. Stosowanie wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Ze względu na działanie symetykonu i brak jego wchłaniania z przewodu pokarmowego do organizmu, nie są spodziewane szkodliwe skutki stosowania wyrobu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Pominięcie zastosowania wyrobu SIMECOL Forte 240: Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Dawkę pojedynczą można uzupełnić w każdej chwili.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie wolno stosować więcej niż 4 kapsułki dziennie u dorosłych i 1 kapsułkę dziennie u dzieci powyżej 12. roku życia.
- Symetykon może zmniejszać biodostępność jednocześnie zażywanych leków. W przypadku konieczności jednoczesnego stosowania wyrobu z innymi lekami, należy zachować co najmniej godziną przerwę pomiędzy zażyciem wyrobu medycznego SIMECOL Forte 240 i innych preparatów. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku jednoczesnego stosowania lewotyroksyny oraz symetykonu należy zachować 4-godzinny odstęp. Jeżeli objawy nasilają się lub utrzymują się przez dłuższy czas, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn: Brak dostępnych danych na temat wpływu wyrobu na obsługę maszyn oraz kierowanie pojazdami.

## PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wyrobu medycznego SIMECOL Forte 240: w przypadku nadwrażliwości na symetykon lub którykolwiek ze składników wyrobu; u dzieci w wieku poniżej 12. roku życia; w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia perforacji lub niedrożności przewodu pokarmowego.