

Sollievo PhysioLax x27 tabletek



Cena: 32,57 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	27 tabletek
Podmiot odpowiedzialny	Aboca
Postać	tabletki
Substancja czynna	cykoria, kminek, koper, mniszek, senes
Typ produktu	wyrób medyczny inny
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu

Sollievo PhysioLax to produkt wskazany do leczenia zaparć.

Działanie produktu uzyskiwane jest dzięki obecności zestawu substancji, które oddziałują na wiele funkcji jelita, wykorzystywanych do regulacji pasażu jelitowego.

Dlatego też Sollievo PhysioLax wykorzystuje nie farmakologiczny mechanizm działania.

DZIAŁANIE PRZECZYSZCZAJĄCE

EFEKT STYMULUJĄCY na pasaż jelit + EFEKT OCHRONNY na błonę śluzową jelita

- zwiększenie ruchliwości jelit
- zwiększenie nawodnienia stolca
- zwiększenie ochrony ściany jelita
- modulowanie stanu zapalnego

Takie przedstawienie mechanizmu działania jest wynikiem naszych badań z zakresu biologii molekularnej i komórkowej połączonych z opracowaniami bioinformatycznymi.

Sollievo PhysioLax otrzymywany jest w drodze całkowitej procesów produkcji, bez wykorzystywania rozpuszczalników ani innych substancji syntezy chemicznej.

SPOSÓB UŻYCIA

- Zaleca się przyjmowanie od 1 do 3 tabletek wieczorem, w razie konieczności, popijając dużą ilością wody. Prawidłowa dawka stanowi minimum wystarczające, aby wspomóc pasaż jelitowy bez wytwarzania płynnego stolca, dlatego można ją dostosować

do indywidualnych potrzeb.

- Produkt jest zalecany od 12. roku życia.

Co do zasady, aby wspomóc pasaż jelitowy, zaleca się przyjmowanie płynów w ciągu dnia, spożywanie odpowiedniej ilości błonnika oraz aktywność fizyczną.

SKŁAD

Kompleks Sollievo PhysioLax (otrzymywany z senesu wąskolistnego, cykorii podróżnik, kopru włoskiego, mniszka lekarskiego, kminku zwyczajnego i kminu rzymskiego) - 420 mg/tabł.

OSTRZEŻENIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub alergii na jeden lub więcej składników. Nie należy przekraczać maksymalnej zalecanej dawki. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. W przypadku uporczywego zatwardzenia należy skonsultować się z lekarzem.