

Steper Pro krem do stóp 15g

Cena: 18,10 PLN



Opis słownikowy

Działanie	przeciwgrzybicze
Miejsce stosowania	ciało, stopy, nogi
Opakowanie	15g
Podmiot odpowiedzialny	Aflofarm
Postać	krem
Problem	grzybica
Substancja czynna	bifonazol
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

Opis produktu

Działanie:

Bifonazol to substancja czynna o szerokim zakresie działania przeciwgrzybiczego. Zawarta jest ona w kremie Steper Pro, który polecany jest do stosowania w leczeniu zakażeń skóry wywołanych przez drożdżaki, dermatofity, pleśnie oraz inne rodzaje gatunków grzybów.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Steper Pro krem wskazany do stosowania w miejscowym leczeniu grzybiczych zakażeń skóry (grzybica stóp, grzybica dłoni, grzybica fałdów skórnych oraz tułowia, kandydozy, łupież pstry), a także w miejscowym leczeniu łupieżu rumieniowatego.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy unikać kontaktu z oczami. Nie wolno połykać. Krem zawiera alkohol stearylowy oraz alkohol cetylowy, może więc przyczynić się do pojawienia miejscowej reakcji skórnej. Stosowanie u dzieci może odbywać się wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie zaleca się stosować w okresie ciąży (zwłaszcza w pierwszym trymestrze) oraz w okresie laktacji.

Działania niepożądane:

Lek Steper Pro może wywoływać działania niepożądane, które jednak ustępują po zakończeniu stosowania preparatu. Nieznana częstość występowania: ból w miejscu podania; obrzęk obrzeżny (w miejscu podania); kontaktowe zapalenie skóry; alergiczne zapalenie skóry; rumień; świąd; wysypka; pokrzywka; pęcherzyki; łuszczenie skóry; wyprysk; suchość skóry; podrażnienie skóry; maceracja skóry; uczucie pieczenia na skórze.

Dawkowanie:

Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazówkami na ulotce. Aplikować raz na dobę, zaleca się stosować wieczorem, przed snem. Jednorazowo należy użyć takiej ilości preparatu, która pokryje cienką warstwą zmienioną chorobowo skórę. Lek należy delikatnie wmasować. Leczenie trwa minimum 2 tygodnie, w zależności od rodzaju schorzenia.