

Supremin MAX 1,5mg/ml syrop 150ml



Cena: 29,52 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	150ml
Podmiot odpowiedzialny	Teva
Postać	syrop
Substancja czynna	butamirato cytrynian
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu

CO TO JEST LEK SUPREMIN MAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Supremin MAX zawiera substancję czynną butamirato cytrynian. Jest ona nieopiodowym lekiem przeciwkaszlowym. Supremin MAX w postaci syropu stosowany jest w objawowym leczeniu ostrego, suchego kaszlu.

INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SUPREMIN MAX

Kiedy nie stosować leku Supremin MAX:

- jeśli pacjent ma uczulenie na butamirato cytrynian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- jeśli pacjent ma objawy ciężkiego zahamowania czynności ośrodka oddechowego
- w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt Ciąża i karmienie piersią)

Dzieci i młodzież

- Leku Supremin MAX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

JAK STOSOWAĆ LEK SUPREMIN MAX

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek należy stosować doustnie, nie dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Do opakowania leku dołączona jest miarka umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej ilości syropu. Miarkę do dawkowania syropu należy umyć i wysuszyć po każdorazowym użyciu.

Zalecana dawka:

- Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu trzy razy na dobę;
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu trzy razy na dobę
- Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu trzy razy na dobę
- Dorośli: 15 ml syropu cztery razy na dobę.

Leku Supremin MAX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.

SKŁAD

- Substancją czynną leku jest butamiratu cytrynian (1,5mg/ml).