

Tantum Rosa 1 mg/ml x5 butelek po 140ml

Cena: 32,46 PLN



Opis słownikowy

Miejsce stosowania	strefa intymna
Opakowanie	5 sztuk
Podmiot odpowiedzialny	Angelini Pharma
Postać	płyn
Substancja czynna	benzydamina
Typ produktu	produkt leczniczy

Opis produktu

Tantum Rosa (gotowe do użycia irygatory z roztworem) to lek stosowany w leczeniu objawów infekcji i podrażnień intymnych oraz w profilaktyce przed i pooperacyjnej w ginekologii. Leczy dolegliwości i objawy (ból, pieczenie, świąd, upławy, zaczerwienienie, obrzęk) okolic intymnych i pochwy.

Lek Tantum Rosa zawiera substancję czynną - benzydaminę, należącą do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Dzięki zawartości benzydminy lek Tantum Rosa charakteryzuje się działaniem: przeciwzapalnym, przeciwbólowym, miejscowo znieczulającym, antyseptycznym i przeciwobrzękowym.

Lek Tantum Rosa ma szerokie zastosowanie w leczeniu dolegliwości i objawów (ból, pieczenie, świąd, upławy, zaczerwienienie, obrzęk) w okolicy zewnętrznych narządów płciowych oraz pochwy w:

- przebiegu stanu zapalnego sromu i pochwy, w tym w łagodzeniu dolegliwości i objawów towarzyszących infekcjom intymnym o różnej etiologii: grzybiczej, bakteryjnej, mieszanej,
- przebiegu zapalenia szyjki macicy różnego pochodzenia (np. zakażenia, podrażnienia mechaniczne),
- profilaktyce przed- i pooperacyjnej w ginekologii (np. przygotowanie do operacji, rekonwalescencja po zabiegu),
- po chemo- i radioterapii u pacjentek onkologicznych.

Tantum Rosa w postaci gotowego do aplikacji roztworu w buteleczkach pozwala na łatwą aplikację leku. Jednorazowe aplikatory zapewniają wygodę i wysoką higienę stosowania. Przyjemny różany zapach pozostawia uczucie świeżości.

Benzydamina stosowana miejscowo dobrze się wchłania, osiągając duże stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym. Daje szybki efekt przeciwbólowy, odczuwalny już od pierwszego zastosowania leku¹. Leczenie benzydaminą nie wpływa na naturalną florę pochwy (nie działa na szczep *Lactobacillus acidophilus*)².

Co zawiera lek Tantum Rosa w postaci roztworu dopochwowego - skład:

- Substancją czynną leku jest benzydaminę chlorowodorek. 100 ml roztworu zawiera 100 mg benzydaminę chlorowodoru.
- Pozostałe składniki pomocnicze to: benzalkoniowy chlorek roztwór, disodu edetynian, etanol 96%, polisorbat 20, olejek różany, woda oczyszczona.
- Postać farmaceutyczna: roztwór dopochwowy.
- Lek Tantum Rosa jest przezroczystym, bezbarwnym roztworem o charakterystycznym różanym zapachu.

Jak stosować lek Tantum Rosa w buteleczkach z roztworem dopochwowym?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Zalecany sposób dawkowania

- od 1 do 2 płukań w ciągu doby, w zależności od nasilenia dolegliwości.

Leczenie dolegliwości i objawów zapalenia zewnętrznych narządów płciowych (okolice krocza i sromu) współistniejącego z zapaleniem pochwy i (lub) szyjki macicy:

- płukać pochwę roztworem od 1 do 2 razy na dobę, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Profilaktyka przed i pooperacyjna w ginekologii:

- lekarz zadecyduje o właściwym stosowaniu leku.

W przypadku samodzielnego rozpoczęcia leczenia nie należy, nieprzerwanie, stosować leku dłużej niż 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zdecydować lekarz.

Celem uzyskania poprawy, leczenie nie powinno trwać krócej niż 3 dni.

Lek przeznaczony jest do płukania pochwy. Każda butelka jest jednorazowego użytku. Zawarty w butelce roztwór dopochwowy, o temperaturze pokojowej, jest gotowy do zastosowania. Możliwe jest podniesienie jego temperatury, poprzez zanurzenie butelki na kilka minut w ciepłej wodzie.

Płukanie należy wykonać w wygodnej pozycji:

- leżącej – najlepiej w pustej wannie
- stojącej – pod prysznicem
- siedzącej – na bidecie lub sedesie.

Instrukcja stosowania:

1. Trzymając butelkę za pierścień należy przekreślić nakładkę tak, aby zerwać zabezpieczenie, a następnie zdjąć nakładkę.
2. Wyciągnąć końcówkę aplikatora do oporu lub do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia. Tylko całkowite wyciągnięcie aplikatora pozwala na odblokowanie zaworu i przeprowadzenie płukania.
3. Pacjentka powinna przyjąć wygodną dla siebie pozycję, a następnie wprowadzić końcówkę aplikatora do pochwy i powoli naciskać ściany butelki, aż do całkowitego jej opróżnienia.
4. Jeśli jest taka możliwość, należy pozostać w pozycji leżącej kilka minut, aby na ten czas zatrzymać roztwór w pochwie.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

¹ Bremond A. *Clinical evaluation of benzydamine for treatment of vaginitis: results of randomized study with emphasis on functional symptoms.* *Int J Tissue React* 1987; 9(2): 147-149.

² Magliano EM et al. *Antibacterial activity of benzydamine against Lactobacillus acidophilus (in Italian).* *G Ital Ostet Ginecol* 1986a; 8(4): 345-347.

Galeria



LEK NA OBJAWY INFEKCJI I PODRAŻNIENIA INTYMNE
5 butelek gotowych do użycia

TR-RO303/2022

Lek TANTUM ROSA[®] zawiera substancję czynną benzydaminę, która wykazuje działanie:

- przeciwzapalne
- przeciwbólowe
- przeciwobrzękowe
- antyseptyczne
- miejscowo znieczulające

Działanie benzydaminy doraźnie zmniejsza objawy i dyskomfort towarzyszący infekcji intymnej

TR-RO303/2022

Jak stosować gotowy roztwór TANTUM ROSA[®]

- Odkręć zabezpieczający kapturek (przykrywkę), który okrywa biały aplikator.
- Wyciągnij końcówkę aplikatora do oporu lub do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.
- W pozycji leżącej, półsiedzącej lub stojącej wprowadź końcówkę aplikatora do pochwy i powoli nadszkaj ścianki butelki do całkowitego opróżnienia.
- Jeśli możesz pozostań w pozycji leżącej kilka minut, aby na ten czas zatrzymać roztwór w pochwie. Stosuj 1 do 2 płukan w ciągu doby.

TR-RO303/2022

Kiedy stosować TANTUM ROSA[®]

Lek Tantum Rosa ma szerokie zastosowanie w leczeniu dolegliwości i objawów (ból, pieczenie, świąd, upławy, zaczerwienienie, obrzęk) w okolicy zewnętrznych narządów płciowych:

- W PRZEBIEGU "wyłącznie do stosowania zewnętrznie, bez płukania"
- W ZABIEGACH GINEKOLOGICZNYCH
- W NAWRACAJĄCYCH INFECTACJACH OKOLIC INTYMNYCH
- W DOLEGLIWOSCACH INTYMNYCH W OKRESIE MENOPAUZY

TR-RO303/2022

IntymNIE dla bólu!



- 20 min** WYKAZUJE SZYBKIE EFEKT PRZECIBÓLOWY - już po 20 minutach od zastosowania
- 12h** POZOSTAJE AKTYWNY w nabłonku pochwy do 12 GODZIN
- HIGIENA STOSOWANIA** – jednorazowe, gotowe do użycia irygatory
- JEST LEKIEM**, a nie kosmetykiem

TR-RO303/2022