

Theraflu MaxGrip x10 saszetek



Cena: 27,56 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	10 saszetek
Podmiot odpowiedzialny	Haleon
Postać	proszek do przygotowania roztworu
Substancja czynna	paracetamol, fenylefryna, witamina C
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu

Theraflu Max Grip wskazany jest do krótkiego leczenia objawów występujących w czasie grypy lub przeziębienia.

Lek Theraflu Max Grip to proszek do sporządzania roztworu o smaku owoców leśnych i mentolu. Dzięki zawartości trzech składników aktywnych działa przeciwgorączkowo, przeciwbólowo oraz udrażniająco przewody nosowe.

Działanie

- udrażnia nos i zatoki, ułatwia oddychanie
- obniża gorączkę
- zmniejsza ból głowy i gardła

Stosowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat

- Jedna saszетка w razie konieczności co 4 do 6 godzin.
- Przed podaniem proszek należy rozpuścić w gorącej wodzie.
- Wsypać zawartość jednej saszетки do szklanki, uzupełnić do połowy gorącą wodą, dobrze wymieszać i wypić. W razie konieczności dodać zimnej wody lub dosłodzić.
- Nie stosować więcej niż 4 saszетки na dobę.
- Nie przekraczać zalecanego dawkowania.
- Bez zalecenia lekarza leku nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni.
- Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Theraflu Max Grip:

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol, fenylefrynę, kwas askorbowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- u osób przyjmujących inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) ani w ciągu 14 dni od zakończenia leczenia takimi lekami,
- u osób przyjmujących zydowudynę,
- u osób, u których stwierdzono chorobę alkoholową, jaskrę zamykającego się kąta, niewydolność wątroby, ciężką niewydolność nerek, nadczynność tarczycy, cukrzycę, choroby układu krążenia, w tym choroby serca, nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnerczy,
- u osób przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne,
- u osób przyjmujących leki blokujące receptory beta-adrenergiczne.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, Theraflu Max Grip może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Theraflu Max Grip może powodować następujące działania niepożądane:

- bardzo rzadko (dotyczące mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)
 - ból głowy,
 - zawroty głowy,
 - bezsenność,
 - nerwowość,
 - zwiększenie ciśnienia tętniczego,
 - nudności i wymioty.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

- Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku podczas ciąży lub gdy pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży i podczas karmienia piersią.
- Jeśli pacjentka planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

- Lek może powodować zawroty głowy. W razie wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30 C.

Składniki

- Substancjami czynnymi leku są: paracetamol, kwas askorbowy (witamina C) i chlorowodorek fenylefryny.
- Każda saszetka zawiera 1000 mg paracetamolu, 70 mg kwasu askorbowego i 10 mg chlorowodoru fenylefryny.
- Pozostałe składniki to:
 - sacharoza, kwas winowy, sodu cytrynian, aspartam, aromat mentolu i owoców leśnych Berry Fruits Flavorburst (zawiera 4-(parahydroksyfenyl)-2-butanon, kwas octowy, wanilina, 1-mentol, d-limonen, aromat kwiatu bzu czarnego, olejek eteryczny bukko, sacharoza, maltodekstryna, skrobia modyfikowana E1450, olej słonecznikowy), barwnik Euroblend Blackcurrant (zawiera karmiozynę E122, zieleń S E142, żółcień pomarańczowa E110, chlorek sodu, siarczan sodu, substancje lotne)