



Opakowanie: 10ml

Podmiot odpowiedzialny: Polpharma

Wiek:

dorośli, dzieci, niemowlęta, od 1 miesiąca życia, od 1 roku życia, od 1 tygodnia życia, od 10 roku życia, od 11 roku życia, od 12 roku życia, od 13 roku życia, od 14 roku życia, od 15 roku życia, od 16 roku życia, od 17 roku życia, od 18 miesiąca życia, od 2 miesiąca życia, od 2 roku życia, od 2 tygodnia życia, od 3 miesiąca życia, od 3 roku życia, od 30 miesiąca życia, od 4 miesiąca życia, od 4 roku życia, od 5 miesiąca życia, od 5 roku życia, od 6 miesiąca życia, od 6 roku życia, od 6 tygodnia życia, od 7 miesiąca życia, od 7 roku życia, od 8 miesiąca życia, od 8 roku życia, od 9 roku życia, od urodzenia

Postać: płyn

Typ produktu: wyrób medyczny leczniczy

Substancja czynna: chlorek sodu

Cena brutto:

sterylny roztwór chlorku sodu przeznaczony do stosowania zewnętrznego u niemowląt, dzieci oraz dorosłych do higieny nosa oraz oczu, oczyszczania ran, płukania uszu oraz rozcieńczania preparatów do inhalacji

1 ampułka z opakowania zbiorczego

- w zakładce "Pliki" do pobrania ulotka

W jakim celu się stosuje

Wyrób medyczny Polpharma 0,9% NaCl to sterylny roztwór chlorku sodu przeznaczony do stosowania zewnętrznego u niemowląt, dzieci oraz dorosłych do higieny nosa oraz oczu, oczyszczania ran, płukania uszu oraz rozcieńczania preparatów do inhalacji.

Stosowanie

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie wyrobu medycznego Polpharma 0,9% NaCl. Przed zastosowaniem należy umyć ręce. Aby otworzyć pojemnik należy ukreślić wydłużony koniec zbiorniczka. Wyrób medyczny Polpharma 0,9% NaCl można stosować do higieny nosa, uszu i oczu 1 do 6 razy dziennie w zależności od potrzeby i zaleceń lekarza.

Przemywanie oczu

- Należy odchylić głowę i uważając aby nie dotknąć końcówką pojemnika powierzchni oka wpuścić płyn. Nadmiar roztworu należy wytrzeć sterylną gazą. Po zastosowaniu roztworu nie należy przez 15 minut podawać do oka innych produktów.
- Bezpośrednio po zastosowaniu roztworu nie należy prowadzić ani obsługiwać maszyn.

Higiena nosa

- Odchylić głowę i do każdego otworu nosowego wpuścić roztwór delikatnie naciskając pojemnik. Nadmiar roztworu należy wytrzeć. Nie należy wydmuchiwać nosa bezpośrednio po zastosowaniu roztworu.

Higiena uszu

- Roztwór służy do przemywania małżowiny usznej i zewnętrznego kanału słuchowego. Należy wkropić roztwór do zewnętrznego przewodu słuchowego, a nadmiar roztworu wytrzeć.
- w przypadku zapalenia uszu, bólu uszu lub innych dolegliwości związanych z uszami oraz u osób z zawrotami głowy lub u których wcześniej wystąpiły dolegliwości ze strony uszu lub błony bębenkowej, roztwór można stosować jedynie po zasięgnięciu opinii lekarza.
- Osoby noszące aparaty słuchowe mogą stosować wyrób medyczny po zdjęciu aparatu.

Przemywanie ran

- Roztworem należy przemyć ranę aby usunąć zanieczyszczenia. Należy uważać, aby końcówką pojemnika nie dotknąć rany. Po przemyciu należy wytrzeć sterylną gazą nadmiar roztworu jedynie z brzegów rany.
- Na tak przygotowaną ranę założyć opatrunek.

Rozcieńczanie preparatów do inhalacji w terapii inhalacyjnej

- Roztwór należy stosować zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu do inhalacji.

Skład

1 ampułka zawiera:

- 0,9% chlorek sodu
- woda oczyszczona
- roztwór nie zawiera substancji konserwujących

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować do iniekcji
- Roztwór należy zużyć bezpośrednio po otwarciu pojemnika. Pozostały po zastosowaniu roztwór nie nadaje się do ponownego użycia.
- Nie stosować roztworu jeśli pojemnik jest uszkodzony, a roztwór nie jest przezroczysty.
- Nie ma przeciwwskazań do stosowania roztworu w okresie ciąży i karmienia piersią.