

# Undofen Amorolfina lakier do paznokci 2,5ml



Cena: 67,03 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	2,5ml
Podmiot odpowiedzialny	Perrigo
Postać	lakier
Problem	grzybica
Substancja czynna	amorolfina
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli

## Opis produktu

Undofen Amorolfina jest lekiem przeciwgrzybiczym w postaci leczniczego lakieru do paznokci, do stosowania miejscowego. Substancja czynna- amorolfina, działa na różnego rodzaju grzyby wywołujące grzybicę paznokci. Wskazaniem do stosowania leku są grzybice paznokci wywołane przez dermatofity, drożdżaki i pleśnie oraz ograniczone do dwóch paznokci oraz do górnych i bocznych części paznokci.

- Precyzyjnie dociera do źródła infekcji i leczy grzybice paznokci.
- Wspiera regenerację paznokcia.
- Wygodna aplikacja raz w tygodniu.
- Kompleksowy zestaw: lakier i niezbędne akcesoria.

## JAK STOSOWAĆ?

Produkt Undofen Amorolfina zawiera w opakowaniu wszystkie niezbędne akcesoria do prawidłowej aplikacji. Lek Undofen Amorolfina, należy nakładać na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp jeden raz w tygodniu.

1. Przed pierwszym nałożeniem leku Undofen Amorolfina, zakażony paznokieć należy dokładnie opłukać za pomocą pilniczka do paznokci.
2. Powierzchnię paznokcia oczyścić i odtłuścić za pomocą dołączonego wacika, nasączonego alkoholem.
3. Lakier należy nanieść szpatułką na całą powierzchnię paznokcia lub paznokci.
4. Po nałożeniu lakieru buteleczkę należy jak najszybciej szczelnie zamknąć.
5. Następnie pozostawić lakier do wyschnięcia na 3 do 5 minut.
6. Szpatułkę po użyciu należy wyczyścić używając tego samego wacika, którym wcześniej czyszczona była płytka paznokcia.

#### **Skład:**

1 ml lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg amorolfiny chlorowodorku).

#### **Wskazania do stosowania:**

Leczenie łagodnej, dalszej i bocznej pod płytkowej grzybicy paznokci wywołanej przez dermatofity, drożdżaki i pleśń, ograniczonej do dwóch paznokci.

#### **Przeciwwskazania:**

Produktu Undofen® Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy nie wolno ponownie stosować u pacjentów, którzy wykazali nadwrażliwość na leczenie. Nadwrażliwość na substancję czynną (amorolfinę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.