

# Venożel żel 100g

Cena: 34,56 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	100g
Podmiot odpowiedzialny	Bausch Health
Postać	żel
Substancja czynna	diklofenak, escyna, trybenozyd
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dorośli, dzieci, od 12 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania i działanie:

Venożel jest lekiem, zawierającym aż 3 substancje czynne: diklofenak, trybenozyd i escynę. Dzięki temu, po podaniu na skórę, działa silnie przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Escyna wykazuje działanie przeciwobrzękowe i uszczelniające śródbłonek naczyń krwionośnych.

Venożel to idealny lek dla osób cierpiących na obrzęki i bóle nóg, zapalenie żył kończyn dolnych, jak również obrzęki pooperacyjne. Żel przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy należy delikatnie wmasować w miejsca zmienione chorobowo.

- Venożel ma szerokie spektrum działania dzięki zawartości aż 3 substancji czynnych.
- Potrójny mechanizm działania: przeciwbólowy, przeciwzapalny i przeciwobrzękowy.
- Przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12-ego roku życia.

### Wskazania do stosowania leku Venożel:

- zapalenia żył kończyn dolnych,
- obrzęki pooperacyjne i pourazowe, obrzęki zastoinowe kończyn dolnych,
- zespoły bólowe związane z chorobami kręgosłupa,
- pourazowy ból mięśni i stawów (stłuczenia, zwichnięcia, naderwania),
- ograniczone i łagodne postaci zapalenia stawów.

### Skład – co zawiera lek Venożel:

- 1 g żelu zawiera 12 mg diklofenaku sodowego (Diclofenacumnatrium), 10 mg trybenozydu (Tribenosidum), 5 mg escyny

(Escinum) i substancje pomocnicze: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer, sodu wodorotlenek i wodę oczyszczoną.

### Dawkowanie – jak stosować lek Venożel:

- Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Venożel należy stosować miejscowo na skórę, 3 do 4 razy na dobę, w odstępach kilkugodzinnych. Ilość użytego żelu należy dostosować do rozmiarów miejsca zmienionego chorobowo. Najczęściej zaleca się jednorazowo zastosować pasek żelu o długości około 4 cm.
- Po nałożeniu żelu należy rozprowadzić i delikatnie wmasować do całkowitego wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce, jeśli leczenie ich nie dotyczy.
- Czas trwania leczenia zależy od rodzaju zmian chorobowych oraz od reakcji na leczenie. Zwykle leczenie trwa nie dłużej niż kilka tygodni (najczęściej do 4 tygodni). W przypadku braku skuteczności leczenia lub z chwilą nasilenia się objawów chorobowych, zaleca się kontrolę lekarską po 7 dniach stosowania żelu.

### Kiedy nie stosować leku Venożel:

- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników leku,
- w przypadku uszkodzeń, zmian zapalnych skóry oraz otwartych ran,
- w ostatnich trzech miesiącach ciąży i w okresie karmienia piersią,
- przy występowaniu napadów astmy, pokrzywki lub ostrych nieżytów nosa po zastosowaniu kwasy acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

### Lek Venożel a inne leki:

- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Podczas prawidłowego stosowania, wystąpienie interakcji substancji czynnych leku z innymi lekami jest mało prawdopodobne.
- Venożel można stosować jednocześnie z innymi postaciami farmaceutycznymi diklofenaku, trybenozydu i escyny (tabletki, czopki itp.). Jednakże w przypadku długotrwałego stosowania leku na duże powierzchnie skóry nie można całkowicie wykluczyć oddziaływania składników leku Venożel z innymi lekami.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku stosowania - długotrwałe i na dużą powierzchnię skóry.

Nie należy stosować leku Venożel:

- na błony śluzowe oraz do oczu; w razie przedostania się żelu do oczu lub na błony śluzowe, należy go usunąć, obficie spłukując wodą,
- pod opatrunki (bandaże, plastry),
- doustnie.

W okresie leczenia oraz 2 tygodnie po zakończeniu leczenia należy unikać bezpośredniego światła słonecznego (również solarium).

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

- W trzecim trymestrze ciąży stosowanie leku Venożel jest przeciwwskazane.
- Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych, nie zaleca się stosowania leku Venożel podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży. W tych przypadkach Venożel można stosować jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść z zastosowania leku u matki przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.

Karmienie piersią

- Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
- Stosowanie leku Venożel u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

- Venożel nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

### Działania niepożądane:

- Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- Rzadko: miejscowe podrażnienie skóry (rumień, pieczenie, świąd, wysypka, reakcje nadwrażliwości na światło, obrzęk), które przemija po zaprzestaniu stosowania leku.

W przypadku długotrwałego stosowania leku na duże powierzchnie skóry, mogą wystąpić objawy niepożądane wynikające z ogólnego działania diklofenaku (np. nudności, biegunka, bóle brzucha, bóle głowy, zapalenie skóry, obrzęk naczynioruchowy, wysypka grudkowata). Częstość występowania tych reakcji jest nieznana. W takich przypadkach należy powiadomić lekarza.

### Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

### Podmiot odpowiedzialny / Wytwórca:

- Bausch Health Ireland Limited
- 3013 Lake Drive
- Citywest Business Campus
- Dublin 24, D24PPT3
- Irlandia

Galeria



**na ból i obrzęki nóg 100 g**

**VENOŻEL 100 g** (10 mg + 10 mg + 5 mg) to silne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Wskazania do stosowania: obrzęki i bóle nóg, w tym obrzęki i bóle nóg po operacjach i urazach. **VENOŻEL 100 g** to silne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Wskazania do stosowania: obrzęki i bóle nóg, w tym obrzęki i bóle nóg po operacjach i urazach.

### VENOŻEL®

Działanie: przeciwbólowe + przeciwzapalne + przeciwobrzękowe

**PRZECIWBÓLOWE**

**PRZECIWPALNE**

**PRZECIWOBRZĘKOWE**

**3 POTRÓJNE DZIAŁANIE:**



**VENOŻEL 100 g** (10 mg + 10 mg + 5 mg) to silne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Wskazania do stosowania: obrzęki i bóle nóg, w tym obrzęki i bóle nóg po operacjach i urazach.

### Jak działa VENOŻEL ?

- łagodzi obrzęki, w tym obrzęki zastońowe kończyn dolnych oraz powstające po operacjach i urazach
- łagodzi ból i stan zapalny żył kończyn dolnych
- uszczelnia naczynia krwionośne



**VENOŻEL 100 g** (10 mg + 10 mg + 5 mg) to silne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Wskazania do stosowania: obrzęki i bóle nóg, w tym obrzęki i bóle nóg po operacjach i urazach.

### Komu poleca się VENOŻEL ?

- osobom, którym dokuczają bóle nóg i obrzęki (także obrzęki pooperacyjne, pourazowe czy zastońowe nóg)
- osobom z zapaleniem żył kończyn dolnych
- osobom narzekającym na ból i obrzęki ze względu na pracę stojącą\*



**VENOŻEL 100 g** (10 mg + 10 mg + 5 mg) to silne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Wskazania do stosowania: obrzęki i bóle nóg, w tym obrzęki i bóle nóg po operacjach i urazach.

### VENOŻEL® SILNE uderzenie w ból i obrzęki nóg



**dostępne wielkości opakowań 50 g i 100 g**

**VENOŻEL 100 g** (10 mg + 10 mg + 5 mg) to silne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe. Wskazania do stosowania: obrzęki i bóle nóg, w tym obrzęki i bóle nóg po operacjach i urazach.