

VICHY Dercos szampon przeciwłupieżowy do włosów normalnych i przetłuszczających się 75ml



Cena: 32,90 PLN

Opis słownikowy

Działanie	łagodzące, pielęgnujące, przeciwłupieżowe
Miejsce stosowania	włosy, skóra głowy
Opakowanie	75ml
Podmiot odpowiedzialny	L'Oréal
Postać	szampon
Przeznaczenie	mycie
Typ produktu	kosmetyk
Typ skóry	normalna, podrażniona, swędząca, wrażliwa
Typ włosów	normalne, przetłuszczające się, z łupieżem

Opis produktu

POLECANY PRZEZ DERMATOLOGÓW:

Szampon przeciwłupieżowy z głęboko oczyszczającą formułą do włosów normalnych i przetłuszczających się.

- Eliminuje do 100% widocznego łupieżu.¹
- Zapobiega nawrotom łupieżu do 6 tygodni.²
- Przywraca równowagę mikrobiomu po 4 tygodniach stosowania.³
- Łagodzi i zmniejsza uczucie swędzenia skóry głowy.

BENEFITY

- Usuwa przyczynę łupieżu.
- Eliminuje do 100% widocznego łupieżu.¹
- 6-tygodniowe działanie przeciw nawrotom łupieżu.²
- Przywraca równowagę mikrobiomu po 4 tygodniach stosowania.³
- Łagodzi i zmniejsza uczucie swędzenia skóry głowy.

KONSYSTENCJA

- Pomarańczowa, kremowa, skoncentrowana konsystencja z dwusiarczkiem selenu.
- 95% pacjentów jest zadowolona z konsystencji.⁴
- 88% pacjentów jest zadowolona z zapachu.⁴

SKŁADNIKI AKTYWNE

FORMUŁA PRZYWRACAJĄCA RÓWNOWAGĘ MIKROBIOMU SKÓRY GŁOWY³

Potężna synergia składników aktywnych, uznanych przez dermatologów:

- 1% dwusiarczku selenu o działaniu przeciwgrzybiczym.
- 1% kwasu salicylowego o działaniu złuszcającym.

SKUTECZNOŚĆ POTWIERDZONA KLINICZNIE

Skuteczność potwierdzona klinicznie:

- 5 badań klinicznych.
- 3 badania obserwacyjne.
- 2607 przebadanych pacjentów.

SPOSÓB UŻYCIA

Nanieś szampon na zwilżone włosy i skórę głowy. Pozostaw na 2 minuty, wmasuj i spłucz.

KURACJA POLECANA PRZEZ DERMATOLOGÓW:

1. FAZA KURACJI:

- W sytuacjach kryzysowych: używaj szamponu 3 razy w tygodniu przez 4 tygodnie.

2. FAZA ZACHOWAWCZA:

- Zapobieganie nawrotom: używaj szamponu raz w tygodniu.

¹ Badanie konsumenckie na 262 pacjentach po 2 tygodniach regularnego stosowania.

² Badanie kliniczne na 45 pacjentach po 4 tygodniach stosowania, badanie przeprowadzone po 6 tygodniach od zaprzestania stosowania.

³ Badanie kliniczne, 45 osób stosujących 3x w tygodniu, zdjęcia odpowiadają równoważnym wynikom oceny łupieżu tłustego.

⁴ Badanie obserwacyjne z udziałem 1619 pacjentów (Europa Wschodnia).