

Xylogel 0,05% żel do nosa w aerozolu 10g



Cena: 22,02 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	10g
Podmiot odpowiedzialny	Polfa Warszawa
Postać	żel
Substancja czynna	ksylometazolina
Typ produktu	produkt leczniczy
Wiek	dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu

Lek Xylogel 0,05% w postaci żelu, zawiera ksylometazoliny chlorowodorek. Zastosowany na błonę śluzową nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza ilość wydzieliny, tj. łagodzi katar. Dodatkowo lek, dzięki temu, że jest w postaci żelu nawilża błonę śluzową nosa oraz nie ścieka na dno jamy nosa i do gardła. Xylogel 0,05% przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Lek Xylogel 0,05% stosuje się miejscowo do nosa w leczeniu pomocniczym:

- ostrego zapalenia błony śluzowej nosa pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego;
- ostrego lub przewlekłego zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych;
- alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa;
- ostrego zapalenia ucha środkowego – w celu udroźnienia trąbki słuchowej.

Kiedy nie stosować leku Xylogel 0,05%

- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6 ulotki);
- u pacjentów po usunięciu przysadki lub po innych zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej;
- w przypadku zanikowego zapalenia błony śluzowej nosa.

Jak stosować lek Xylogel 0,05%

- Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Xylogel 0,05% jest przeznaczony wyłącznie do stosowania do nosa (również w zapaleniu ucha

środkowego).

- 1 dawka zawiera 0,05 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
- Xylogel 0,05% przeznaczony jest do stosowania u dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

Dzieci w wieku od 3 do 12 lat:

- 1 dawka żelu do każdego otworu nosowego co 8 do 10 godzin.
- Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
- Leku Xylogel 0,05% nie należy stosować dłużej niż 3 do 5 dni.
- Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

Co zawiera lek Xylogel 0,05%

- Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek. Każdy gram żelu do nosa zawiera 0,5 mg ksylometazoliny chlorowodorku.